
TP 11: Équations différentielles ordinaires. Existence.

Exercice 1. *Théorème d'explosion en temps fini.* Soit $y : I \subseteq \mathbb{R}^d$ une solution *maximale* d'une équation différentielle autonome $y'(t) = F(y(t))$, $y(0) = y_0$, où $F : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ est localement lipschitzienne.

1. Démontrer que l'intervalle I est ouvert.
2. Supposons que $I =]a, b[$ avec $b < +\infty$, et qu'il existe un compact K tel que $y(t)$ reste dans K pour t dans $[t_0, b[$. Montrer alors que y est Lipschitzienne sur $[t_0, b[$. En déduire que y admet une limite en b .
3. Appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz pour aboutir à une contradiction (un tel compact K ne peut pas exister).
4. En déduire : $\limsup_{t \rightarrow b} \|y(t)\| = +\infty$

Exercice 2. *Existence globale.* On considère le système différentiel suivant, modélisant une population animale divisée en juvéniles et adultes :

$$\begin{cases} J'(t) = \alpha A(t) - J(t) \\ A'(t) = J(t) - \beta A^2(t) \\ (J, A)(0) = (J_0, A_0), \end{cases}$$

avec $J_0, A_0 \geq 0$ et $\alpha > \beta > 0$.

1. Donner une interprétation de ce modèle.
2. Démontrer l'existence locale de solutions.
3. Montrer que J et A restent toujours positifs.
4. On note $\Phi(j, a) = \frac{1}{2}(j - \beta a^2)^2 + \frac{\beta}{3}a^3 - \frac{\alpha}{2}a^2$. Montrer que la fonction $t \mapsto \Phi(J(t), A(t))$ est strictement décroissante.
5. En déduire que les trajectoires de l'EDO sont bornées, puis qu'elles existent en tout temps.